

PTAČÍ CHŘIPKA

Co je ptačí chřipka

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Původcem nákazy je virus chřipky H5N1. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy.

Příznaky ptačí chřipky u ptáků

- infikovaná zvířata jsou otupělá až netečná (apatická), odmítají se pohybovat
- mají načepýřené peří
- příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství
- snáška vajec se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví, vejce jsou deformovaná
- některá zvířata vykazují příznaky nachlazení - výtok z nosu, kýčání
- zjišťovány jsou krváceniny a nekrologické změny na hřebínku a lalůčcích, otok hlavy
- mohou se objevit krváceniny a otoky na končetinách
- postižená zvířata hynou v průběhu 1 – 2 dnů, je-li příčinou chřipka lze potvrdit pouze ve specializované laboratoři

Příznaky ptačí chřipky u člověka

Příznaky onemocnění jsou podobné příznakům běžné chřipky:

- teplota, kašel, škrábání v krku
- svalové bolesti
- stavy dechové netečnosti
- jiné stavy bezprostředně ohrožující život nakaženého

V současné době jsou běžně vyráběna některá antivirotika. Více informací získáte u svého lékaře.

Jak se ptačí chřipka přenáší

Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s nakaženou drůbeží nebo jejími exkremty. Možný je i přenos kontaminovanými povrchy.

- sliny a nosní sekrety
- trus nemocných ptáků
- moč nakažených zvířat
- peří
- uhynulá zvířata

Světová zdravotnická organizace WHO nepovažuje jídlo z drůbeže za nebezpečné.

Nebyl dosud prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Možnost ochrany před nakažením ptačí chřipkou

Osobní ochrana v domácnosti

Nejvýznamnější je dodržování zásad dobré osobní hygieny:

- mytí rukou po každém kontaktu se zvířaty nebo jejich exkremty
- před a po zpracování drůbeže si řádně umyjte ruce
- maso vždy dobře omyjte teplou vodou
- saponátem umyjte pečlivě všechny nástroje a povrchy, které přišli do kontaktu se zpracovávaným masem
- maso řádně uvařit nebo propéct až ke kosti
- není doporučena konzumace syrových vajec ani výrobků z nich

Pozor virus H5N1 může přežívat i déle než jeden měsíc při nízkých teplotách. Proto ani mražení nezajistí jeho usmrcení.

Osobní ochrana v chovu

V případě podezření z nákazy v chovu, by lidé ošetřující zvířata měli neustále nosit tyto ochranné pomůcky:

- pracovní oděv pokrývající i hlavu
- pokrývku hlavy, která zcela zakryje vlasy
- obuv, kterou lze desinfikovat
- omyvatelné rukavice, které lze desinfikovat
- vhodný typ respirátoru (TH2P, TH3P) při práci v uzavřených prostorách
- ochranné brýle zabraňující pronikání prachu

Ochrana zvířat

- drůbež je třeba držet v uzavřených prostorách a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem
- slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží
- dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny
- při podezření z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které byly vyneseny z prostor se zvířaty

Obecná ochrana

Pokud uvidíte neobvykle zvýšený nebo náhlý úhyn chované drůbeže nebo volně žijící ptáky, měli byste událost neprodleně oznámit na příslušné krajské veterinární správě a jejich inspektorátech, které jsou v každém okrese nebo na policii.

Státní veterinární správou byla zřízena krizová linka, která je určena zejména pro hlášení hromadných úhynů zvířat, havárií při přepravě zvířat a pro hlášení podezření z nebezpečné nákazy zvířat.

Tato linka je provozována bez omezení 24 hodin denně na tel. čísle 720 995 204.

Jan Kundrlík
Odbor Krizového řízení MěÚ Sedlčany